

Kačių plaukų slinkimo(Alopecijos) priežastys

Yra daug ligų , kurių pasekoje slenka(krenta) plaukai paš kates.Kartais tai yra normalu, o kartais tai rodo sisteminės ligos priežastį bei jos pradžią.Ši lentelė padės geriau suprasti bei pastebėti pirmus ligos požymius.Atmintina tai , kad yra daug priežasčių kurios sukelia odos ligas, todėl nereikėtų savo nuožiūra skirti gydymą savo gyvūnui.Rekomenduojama pasikonsultuoti su savo veterinarijos gydytoju.

Priežastys	Apibudinimas	Simptomai	Diagnozė	Gydymas
Kontaktinis alerginis dermatitas	Daug alerginių reakcijų sukelia kontaktas su alergenais.Tai antibiotikų naudojimas ant odos,metalai(nikelis),kaučiukas, vilna,plastikas,dezodorantai, cheminės medžiagos naudojimas buityje,sintetika(sintetiniai kilimėliai,guoliai).	Odos paraudimas ir raudoni taškeliai.Ypaš tos vietos kuriomis buvo kontaktuota su alergenais.Paraudimai lokalizuoti,stiprus niežėjimas,plaukų iškritimas.	Odos testas	Pašalinti sukėlusią priežastį. Steroidai, antihistamininiai preparatai.
Lokaluota alopecija	Manoma kad tai autoimuninės kilmės susirgimas	Plaukų iškritimas židiniais(lopeliais).Būdingos vietos galva, kaklas, kūnas.Nėra niežėjimo.	Plauko mikroskopija,biopsija	Paprastai pasveikstama spontaniškai
Atopijos	Alerginės reakcijos į įkvėpiamus alergenų(žiedadulkės, namų dulkių erkutės,pelėšiai)	Letenų laižymas,akių paraudimas,ašarojimas,niežulys,kartais išaukia infiltruotus infekcijos, odos paraudimus.	Alergologinis(intraderminis) bei serologinis kraujo tyrimas nustatyti alergenams.	Išsiaiškinti ir pašalinti sukėlusią priežastį.Steroidai,omega 3 rūgštys,antihistamininiai preparatai,šampūnai Imunoterapija.
Bakterinės infekcijos. (Pioderma) Folikulitas.	Tai pirminių odos ligų pasėkmė(parazitinių,alerginių, dėl hormonų disbalanso)	Paraudimai,niežulys,plaukų iškritimai,šašeliai, pūslelės,nemalonus odos kvapas.	Mikrobiologinis tyrimas. Serologinis kraujo tyrimas.Biopsija.	Antibiotikai,šampūnai, Omega 3 rūgštys.Vit A+E
Chemoterapija	Plaukai nuslenka po chemoterapijos kurso.	Katėms nuslenka plaukai,kailis tampa minkštas,gali iškristi ūsai.		Plaukai gali ataugti po chemoterapijos,bet gali pasikeisti jų spalva ir struktūra.
Cheyletiella (triušio kailio erkutė) niežai	Užsikrėtimas Cheyletiella rūšies erkutėmis.	Niežulys, kailio žvynuotumas,plaukų iškritimas.	Odos skutenos ir mikroskopija.Erkutės nustatymas.Nors labai sunkiai surandama.	Pyretroidai
Įgimta hypothirozė	Įgimtas plaukų trūkumas. Veislės(Siamo,Devon-rex)	Kačiukai gimsta be plaukų arba labai mažai plaukų.Kurie iškremta sulaukus 4 mėnesių amžiaus.	Klinikinis įvertinimas,biopsija	nėra

Kušingo liga (Hyperadrenokorticismas)	Padidėjusi organizme kortikosteroidų gamyba. Arba šalutinis kortikosteroidų terapijos poveikis.	Plaukų iškritimas, odos suplonėjimas, hyperpigmentacija, seborėja, kamedonai (juodos dėmės), siplnumas, padidėjęs troškulys ir šlapinimasis, padidėjęs (išsipūtęs pilvas).	Antinskčių liaukų funkcinis tyrimas, šlapimo tyrimas, biocheminis kraujo tyrimas.	Jei nustatoma auglys pašalinamas chirurgiškai. Nutraukti steroidų naudojimą. Mitotanas
Demodekozė (demodex erkutės sukelti niežai)	Lokaluota (neišplitusi) forma. Generalizuota (išplitusi, apimanti didelį kūno plotą) forma. Generalizuota forma būna pas kates kurios turi imuninės sistemos patologija.	Plaukų slinkimas, odos žvynuotumas, paraudimai, kartais niežėjimas.	Odos skutenos ir mikroskopavimas	Negalima naudoti steroidų! Rotenonas Amitrazė Ivermectin
Vaistų ar injekcijos vietos odos reakcija.	Retos odos reakcijos. Dažniausiai po dviejų sav. pasireiškia odos vietinė reakcija (penicilinams, sulfonamidams)	Gali atsirasti niežulys, kailio iškritimas, paraudimas, puslelės, šašeliai, opos	Anamnezės duomenys, biopsija, simptomai	Nutraukti vaistų vartojimą. Gydyti simptomiškai
Odos eritema (Erythema multiforme)	Per didelis jautrumas infekcijai ar vaistams, vėžio atsiradimas, kitos ligos.	Kailio slinkimas, pūslelių atsiradimas apie burną, akių, ausų, kirkšnių paraudimai, opos, karštis, depresija, padidėjęs jautrumas	Anamnezės duomenys, klinikiniai požymiai, odos biopsija.	Pašalinti priežastį ir gydymas.
Veido alopecija Plaukai iškremta apie akis	Normos ribose sumažėjęs plaukų tankumas tarp akies ir ausies.	Šis odos pakitimas prasideda katėms nuo 14 iki 20 mėn. amžiaus. Labiau pasitaiko pas trumpaplaukes, ir tamsesnio kailio kates.	Daromi odos tyrimai jei yra paraudimai, niežulys.	Negydoma
Kačių simetrinė alopecija.	Retai diagnozuojama. Dar vadinama kačių „endokrininė“ alopecija. Priežastys nežinomos.	Simetriškai nuslenka plaukai nuo užpakalinių kojų šlaunų, nuo pilvo, genitalijų srityje. Plaukai greitai iškremta. Nėra niežulio.	Odos skutenos atmesti kitoms diagnozėms.	Nėra gydymo
Blusų sukeltas odos alerginis dermatitas	Jautrumas blusų įkandimams, bei blusų išskiriamoms cheminėms medžiagoms (alergenams).	Intensyvus niežulys, paraudimai, plaukų iškritimas, pūslelės, šašeliai. Kartais sukelia odos infekciją.	Intraderminis testas	Blusų naikinimas ant gyvūno ir aplinkoje. Steroidai Antihistaminai.
Folikulitas	Plauko folikulo infekcija. Simptomai apima veidą, nugarą ir galvą.	Spuogeliai ant odos palaipsniui virsta šašeliais, kurie sudaro didelius šašus. Gali būti niežulys arba kailio iškritimas.	Odos skutenos Biopsija Mikrobiologinis tyrimas.	Antibiotikai 3-4 sav. Šampūnai
Maistinė alergija	Alerginė reakcija į maistą	Kojų (pėdų) laižymas, paraudusios akys, niežulys, plaukų slinkimas, kartais sukelia infekcinę odos susirgimą.	Pakeisti maistą (dieta)	
Granulomos	Gali atsirasti dėl infekcijos, dėl sąlyčio su augalų, dėl chirurginių siūlų, dėl pastovaus odos suerzinimo.	Įvairaus dydžio mazgeliai, kietos dėmės, odos išsausėjimas. Išaukiamas plaukų slinkimas bei odos infekcijos.	Anamnezės duomenys, klinikiniai požymiai, biopsija, chirurginis ištyrimas	Priežasties pašalinimas. Chirurginis gydymas Antibiotikai.
Plaukų slinkimas susijęs su katės nėštumu	Padidėjęs plaukų slinkimas dėl ligos, dėl streso, nėštumo.	Staigus ir išplitęs plaukų slinkimas.	Anamnezės duomenys, klinikiniai	Pirminės ligos gydy-

			požymiai	mas.Plaukai atauga savaime.
Hypertyroidizmas	Apie 1/3 kačių sergančių šia liga atsiranda plaukų slinkimas. Tai susijęs su hormonų apykaitos sutrikimu.	Plaukų slinkimas, plaukai lengvai iškremta, odos seborėja (pleiskanojimas).	Klinikinis tyrimas. Kraujo tyrimas skydliaukės hormonams nustyti.	Chirurginis gydymas. Jodo terapija. Methimazol
Injekcijos vietos alopecija (kailio iškritimas)	Plaukai iškremta injekcijos vietoje, kur buvo sušvirkšta vakcina, vaistai. Gali atsirasti opos.	Plaukai gali kristi kelis mėn. po injekcijos. Odos hyperpigmentacija.	Anamnezės duomenys. Klinikinis įvertinimas.	Gydymo nėra
Utelės	Užsikrėtimas įvairių rūšių utelėmis.	Įvairūs. Kailio slinkimas, niežulys, šašeliai ant odos.	Utelių ir glindų radimas odoje.	Pyretroidai Ivermektinas
Malassezia (mieliagrybis)	Kitų odos ligų pasekmė	Niežulys, paraudimas, kailio iškritimas, odos riebaluotumas, nemalonus sieros kvapas, hyperpigmentacija.	Odos skutenų mikroskopavimas. Mikrobiologinis įvertinimas auginant kultūras.	Pirminės ligos gydymas. Ketokonazol Mikonazol Šampūnai
Psihogeninis dermatitas	Pastovus laižymasis kurių pasekoje traumuojama oda (nerimas, stresas, nuobodulys, naujo gyvūno atsiradimas namuose)	Simetrinis plaukų slinkimas, kartais opos ant pilvo, letenų, kirkšnyje.	Išsiaiškinti priežastis	Pašalinti ligos sukėlusią priežastį Raminantys vaistai
Dermatofitija (odos grybelis)	Įvairių rūšių grybelio užsikrėtimas.	Kailio iškritimas, žvynuotumas, kartais niežulys	Grybo kultūrų auginimas	Miconazol Griseofulvin Itraconazole Ketoconazol
Seborėja (pleiskanojimas)	Gali būti pirminė liga. Gali būti kitų ligų pasekmė (kačių FIV, FeLV) odos grybelio, parazitų.	Pleiskanos, priklausomai nuo tipo gali būti odos riebaluotumas, sausumas, nemalonus kvapas, kartais niežulys, galimas kailio slinkimas.	Kraujo tyrimas Odos skutenos Klinikiniai požymiai	Pirminės ligos gydymas. Šampūnai Omega 3
Dermatitas (nuo saulės poveikio)	Odos reakcija į saulės šviesą. Dažniau būna šviesaus kailio katėms	Paraudimas, kailio iškritimas ir nuplikimai apie ausis, nosį. Vėliau šašai ir opos.	Anamnezės duomenys. Klinikinis įvertinimas. Biopsija.	Vengti saulės kaitros. Pavėsis Steroidai
Riebalinių liaukų hiperplazija (uodegos srityje)	Riebalinių liaukų padidėjimas, gali turėti aiškias ribas, būna nekastruotiems katinams	Odos riebaluotumas, iškritęs kailis, šašeliai, oda hyperpigmentuota.	Klinikiniai požymiai	Kastracija Antiseborėjiniai šampūnai. Retinoidai